



**Núcleo Avancado de Tratamento Odontológico**

PRODUZINDO AUTOESTIMA DESDE 1990

*Direção: Drs. Luiz Alberto Ferraz de Caldas e Carla Gonçalves Gamba*

*Board in Conscious Sedation and Implantology – Division of Oral and Maxillofacial Surgery Strict School of Medicine- Loyola University USA*

*Mestres em Saúde Coletiva UNICAMP Mestres em Farmacologia UFLA*

***Cirurgia = Reabilitação Oral = Implantodontia = Endodontia = Periodontia = Odontopediatria = Pacientes Especiais Traumatismo Dental***

## **AIDS e o Dentista**

### **Existe risco de o paciente se infectar com o vírus da AIDS durante o tratamento odontológico?**

Não, desde que os instrumentais que tenham sido utilizados em pacientes com AIDS tenham sido esterilizados corretamente.

### **Esse tipo de esterilização é um processo complicado?**

Não, pois as estufas de calor seco, que todos nós possuímos, são capazes de promover facilmente a destruição do vírus HIV.

### **O vírus HIV é mais difícil de ser destruído que microorganismos causadores de outras doenças?**

Não. Felizmente ele é facilmente inativado. O treponema pallidum, causador da sífilis, e o HBV, causador da hepatite B, são bem mais resistentes.

### **Quais os cuidados que o cirurgião-dentista deve tomar para evitar o contágio?**

Além da esterilização dos instrumentos, usar e eliminar, após cada paciente, o máximo possível de materiais descartáveis, como agulha, tubetes anestésicos, luvas, pontas de sugador de saliva etc.

### **E as brocas, como devem ser esterilizadas?**

Elas devem ser lavadas e desinfetadas em soluções químicas de glutaraldeído ou, preferencialmente, esterilizadas em estufa de calor seco.

### **O dentista deve usar um par de luvas novas a cada paciente?**

Sim, pois a luva é considerada um material descartável e, portanto, deve ser eliminada após cada atendimento.

### **Através do exame bucal, o dentista pode suspeitar que o paciente tem AIDS?**

Sim, pois existem várias doenças na boca que ocorrem preferencialmente em pacientes HIV positivos.

### **O dentista pode recusar a atender um paciente soropositivo para HIV?**

Legalmente, o dentista pode recusar-se a atender qualquer paciente. Porém, eticamente, ele tem a obrigação de atender o paciente com AIDS em situações emergenciais e de encaminhá-lo a um profissional capacitado, caso julgue necessário.

*Unidade 1: Av. Ayrton Senna 1850 Gr 306 Shopping Barra Plaza - Barra da Tijuca - Telefone: 3329-3000 fax: 2430-3326*

*Unidade 2: Rua Bonifácio Portela, 05 – Sala 227 – Shopping Florescer – Miguel Pereira Telefax: (24) 2484 – 5273*

**URGÊNCIAS: (21) 81559092**

e-mail: [nato@gruponitro.com.br](mailto:nato@gruponitro.com.br) : website: [www.gruponitro.com.br](http://www.gruponitro.com.br)



**Núcleo Avancado de Tratamento Odontológico**

PRODUZINDO AUTOESTIMA DESDE 1990

*Direção: Drs. Luiz Alberto Ferraz de Caldas e Carla Gonçalves Gamba*

*Board in Conscious Sedation and Implantology – Division of Oral and Maxillofacial Surgery Strict School of Medicine- Loyola University USA*

*Mestres em Saúde Coletiva UNICAMP Mestres em Farmacologia UFLA*

***Cirurgia = Reabilitação Oral = Implantodontia = Endodontia = Periodontia = Odontopediatria = Pacientes Especiais Traumatismo Dental***

---

**O paciente HIV positivo deve informar ao dentista a sua condição?**

Sim, pois sendo este um paciente imunodeprimido, alguns cuidados especiais devem ser tomados com esse paciente, como por exemplo cobertura antibiótica após exodontias.

**O dentista pode solicitar o exame anti-HIV?**

Sim, desde que o paciente concorde e tenha o conhecimento dessa solicitação.

**Quem corre mais riscos de contaminação no consultório dentário: o dentista ou o paciente?**

Embora o risco de contaminação seja mínimo, o dentista, por estar em contato com os fluidos que podem conter vírus, como o sangue e a saliva, está mais sujeito à contaminação.

**Fonte: Revista da APCD**